척추마취중 발생한 심한 서맥과 저혈압

— 증례보고 —

서울 적십자병원 마취과

김현옥 · 정창우 · 김홍렬 · 이동기

— Abstract —

Severe Bradycardia & Hypotension during Spinal Anesthesia

Hyeon Ok Kim, M.D., Chang Woo Chung, M.D., Hong Youl Kim, M.D. and Dong Ki Lee, M.D.

Department of Anesthesiology, Seoul Red Cross Hospital, Seoul, Korea

Spinal anesthesia has been widely used for operations performed in the lower abdomen, inguinal regions, lower extremities, and perineum. When patient have severe systemic disease and a full stomach, spinal anesthesia is may be more safe than general anesthesia.

Bradycardia and hypotension have been accepted to be the most common complications in cardiovascular system during spinal anesthesia. The mechanisms are a decrease in total peripheral vascular resistance, a decrease in cardiac output or a combination of both. Accessory factors include bradycardia resulting from block of accelerator impulses to the heart or decrease in endogeneous release of norepinephrine from sympathetic nerve endings, thereby reducing myocardial contractility.

We report 2 cases of sudden extreme bradycardia and hypotension in patients who had received spinal anesthesia. Although the exact pathophysiology of this phenomenon is unknown, the etiology is probably vagal effect.

Thus the patient who receives spinal anesthesia should be required constant monitoring and vigilance throughout all procedures.

Key Words: Spinal anesthesia, Bradycardia, Hypotension, Vagal effect

서 론

척추마취는 하복부, 서혜부, 하지 또는 회음부 수술에 흔히 사용되는 마취방법중의 하나로 1885년 Corning¹⁾이 최초로 cocaine을 척수로 주입하여 척추마취를 시행한 이래 100여년 동안 시행되어온 마취방법중의 하나로 특히 전신마취에 대해 위험도가 높은 환자중 하복부, 하지 수술중 많이 시행되어지고 있다. 척추마취중 흔히 나타나는 심혈관 변화는 교감신경의 차단 정도에따라 다소 차이는 있지만 서맥과 저혈압의 발생이며, 심한 경우 신속한 교정을 하지않으면 의식 소실 및 심장지에까지 이르게된다. 최근 저자들은 T-caine[®]을 사용한 척추마취

하에 충수절제술과 치핵절제술을 받은 환자에서 강한 반사성 미주신경 자극에 의한 것으로 판단되는 심한 서맥과 저혈압을 경험 하였기에 문헌적 고찰과 함께 보고하는 바이다.

증 례

증 례 1.

56세 남자환자가 우하복부 통증과 고열로 급성 충수염 진단하에 충수 절제술을 받기 위해 입원하였다. 수술전 이학적 검사상 특이소견은 없었으며, 흉부 방사선 검사 소견상 폐기종을 보였으며 혈액검사, 소변검사, 심전도 등은 모두 정상 범위이었다. 마취 전투약은 시행하지 않

있으며 수술실 도착시 의식은 명료하였고 안정된 상태이었다. 체중 48 kg, 신장 162 cm 이었으며, 혈압 120/80 mmHg, 심박수는 분당 80회 이었다. 정맥로를 통해 하트만 용액 500 cc를 빠른 속도로 투여 후 환자를 우측와위 상태에서 25 gauge Pitkin 바늘을 사용해 제 3~4 요추간에 척추천자를 시행하여 뇌척수액에 혈액이 섞이지 않은 흐름을 확인 후 T-caine 15 mg에 epinephrine 0.1 mg을 첨가하여 주입하고 양와위를 취하였으며 통증감각 소실여부로 마취 정도를 측정하였다. 마취시작 15분 후 제 4 흉추 피부절의 통증감각 소실이 확인되었으며, 혈압 100/80 mmHg, 심박수 분당 112회 이었고 환자는 별다른 호소가 없었다. 이때 수술을 시작하였고 5분 간격으로 혈압과 심박수를 측정하였다. 마취시작 30분 후 발한, 오심, 현기증의 증상을 나타내며 혈압 60/40 mmHg, 심박수 20회를 보여 즉각적으로 수술을 중단하고 atropine 0.5 mg, ephedrine 20 mg을 정맥로를 통하여 주입하고, 마스크로 산소를 분당 6L 공급하기 시작하였다. 이때 환자와의 의사소통은 원활하였으며 심한 가슴통증과 답답함을 호소하였다. 처치 3분후 혈압 110/80 mmHg, 심박수 분당 78회로 정상으로 되돌아왔으며 다시 수술을 시작하였고, 그 후 수술기간 동안에는 특이할만한 사실은 없었다.

증 례 2.

28세 남자가 항문 동출과 항문 출혈로 내원하여 치핵 진단하에 치핵 절제술을 받기위해 입원하였다. 술전 이학적 검사상 특이사항은 없었으며 흉부방사선 소견상 우상엽부의 비활동성 폐결핵을 보인것 이외에는, 혈액검사, 소변검사, 간기능 검사, 심전도 등은 정상 범위 이었다. 마취 전투약은 lorazepam 2 mg, glycopyrrolate 0.2 mg을 마취시작 1시간전에 근육주사 하였으며, 수술실 도착시 혈압 100/70 mmHg, 심박수 분당 68회 이었으며 신장 165 cm, 체중 57 kg이었고 다른 특이소견은 없었다. 정맥로를 통해 하트만 용액 500 cc를 빠른 속도로 투여 후 환자는 우측와위 상태에서 25 gauge Pitkin 바늘을 사용하여 제 3~4 요추간에 척추천자를 시행한 후 뇌척수액에 혈액이 섞이지 않은 흐름을 확인 후 T-caine 5 mg을 주입하고 환자를 양와위로 한 후 15분이 지나 제 1 천추 피부절의 통증감각이 소실되었으며, 이때 수술을 시작하였고 5분 간격으로 혈압과 맥박수를 측정하였다. 수술 시작 1시간 까지는 혈압 110~100/

70~60 mmHg, 심박수 분당 77~55회 정도 범위 내에서 비교적 안정하게 유지되었으나 마취시작 1시간 15분 후 갑자기 심전도상에 서맥이 보이기 시작하여 불과 수분내에 분당 48회에서 15회까지 하강하였고, 혈압 60/30 mmHg로 하강하였으며 발한, 오심, 현기증을 호소하였다. 이때 atropine 0.5 mg, ephedrine 20 mg을 정맥내 주입하고 분당 6L 산소를 마스크로 투여하였다. 처치 3분후 혈압 120/80 mmHg, 심박수 분당 90 회로 상승, 계속 안정된 상태를 보였고 이후 특이할 사항은 발견되지 않았다.

고 안

척추마취에 의한 심혈관 변화중 가장 흔히 나타나는 합병증은 서맥과 저혈압으로 알려져 있으며 갑작스런 발생의 유발기전은 아직도 논란이 되고 있다. 고위 척추마취시 발생하는 갑작스럽고 심한 서맥과 심정지는 Caplan 등과 Wetstone이 발표한 바 있으며^{2,3)} 또한 Bainbridge와 Kappagoda 등에 의하면 정맥혈 환류의 감소와 좌심방압의 하강으로 인한 미주신경 반사에의해 서맥을 유발시킨다고 보고된 바 있다^{4,5)}. 제 5흉추 이상의 감각소실시 저혈압과 서맥을 유발시키게 되는데^{6,7)} 이는 척수의 교감신경 마비에 의한 말초혈관 저항 감소 및 말초혈액 저류에 의한 심박출량 감소와 아울러 심박수 감소등에 의한다고 하는데 척수의 교감신경은 제 1 흉추에서 제 2 요추 척수에서 기원하고 심장박동을 촉진시키는 신경섬유는 제 1. 2. 3. 4 흉추 척수에 분포되어 있기 때문에 고위 척추마취시 서맥과 저혈압을 초래한다^{8,9)}. Mackey 등에 의하면 서맥의 발현기전으로 첫째, Bezold-Jarisch reflex 둘째, 수술전에 이미 자율신경 부전증에 빠져있는 환자, 특히 당뇨, 후천성 면역결핍증 환자, 노인 등에서 더 잘 발생한다고 하였다⁸⁻¹¹⁾. Bezold-Jarisch reflex는 좌심실의 후하벽에 위치한 기계적 수용체와 화학적 수용체로써, 긴장, 화학물질, 약물에 자극되어 부교감 신경을 활성화시키고 교감신경 활동은 억제시켜, 서맥, 전신의 혈관확장 그리고 저혈압을 유발한다^{12,13)}.

전투약 약물과 치료약물도 서맥과 저혈압을 초래할 수 있다. Hilgenberg와 Johantgen¹⁴⁾은 고위 척추마취시 교감신경의 차단과 fentanyl의 미주신경 강화효과로 갑작스런 서맥이 출현한다 하였으며 Fortuna¹⁵⁾는 척추마

취시 droperidol의 alpha-adrenergic 차단 효과로 심한 저혈압과 갑작스런 서맥과 심정지를 초래한다고 보고하였다. 저산소증과 고탄산증은 중심교감신경이 차단되었을 때 직접적으로 말초혈관의 확장을 일으키며¹⁰⁾ 말초혈관 확장은 중심정맥 환류의 감소와 심방축적의 감소를 일으키고 감소된 심방축적은 미주신경의 긴장도를 활성화시켜 서맥과 저혈압 그리고 심정지까지 초래한다.

저자들이 경험한 이 증례의 경우, 증례 1의 충수절제술시 발생한 서맥의 가능한 기전으로는 복막 견인에 의한 복신경총 반사작용과 심교감신경 차단에 기인한다고 사료되며^{6,14,17)} 증례 2에서 항문 괄약근과 거상근의 신경 분포는 교감신경과 부교감신경 모두의 지배를 받고 있으며 특히 회음부 신경과 제 2, 3, 4 천추 신경의 지배를 받는다¹⁸⁾. 모든 척추마취시 제 2, 3, 4 천수에서 기원한 부교감 신경의 마비가 일어나며, 생식기와 하부요도를 제외한 다른 부위에서는 생리적 효과가 작다⁹⁾. 이 증례에서는 교감 신경 차단에 따른 마비되지 않은 부교감 신경 활동증가로 기인한다고 생각되며 이 기전에 대한 자세한 연구가 필요하리라 생각한다. 척추마취시 발생하는 서맥과 저혈압의 치료는 전해질 용액의 신속한 정맥내 주입, 하지 거상/두부 하강 체위, atropine/ephedrine의 정주, 마스크를 통한 산소 공급등의 방법이 있으며^{6,19-21)}, 전혀 예상치 못한 불의의 사고를 사전 예방하기 위하여 환자 감시를 철저히 하고 신속한 인지 및 적절한 처치가 병행되어야 할 것이다^{2,8,21,22)}.

결 론

척추 마취시 갑자기 발생한 심한 서맥과 저혈압에 대해 보고 하였다. 이 현상에 대한 정확한 병태생리는 모르지만, 갑자기 발생한 심한 서맥과 저혈압은 강한 반사성 미주신경 자극에 의한 것으로 사료된다.

참 고 문 헌

- 1) Dripps RD, Eckenhoff JE, Vandom LD: *Introduction to anesthesia*. 7th ed, Philadelphia, WB Saunders, 1988, p223
- 2) Caplan RA, Ward RT, Posner K: *Unexpected cardiac arrest during spinal anesthesia. a closed claims analysis of predisposing factors*. *Anesthesiology* 68:5, 1988
- 3) Wetstone DL, Wong KC: *Sinus bradycardia and asystole during spinal anesthesia*. *Anesthesiology* 41: 87, 1974
- 4) Bainbridge FA: *The influence of venous filling upon the rate of the heart*. *J physiol (Lond)* 50:65, 1915
- 5) Kappagoda LT, Linden RJ, Snow HM: *A reflex increase in heart rate from distension of the junction between the superior vena cava and the Rt atrium*. *J Physiol (Lond)* 220:177, 1972
- 6) Greene NM: *Physiology of spinal anesthesia*. 2nd ed, Baltimore, Williams & Wilkins 1969
- 7) Cook PR, Malquist LA: *Vagal & sympathetic activity during spinal analgesia*. *Acta Anesth. Scand* 34:271, 1990
- 8) Mackey DC, Carpender RL, Thompson GE: *Bradycardia and asystole during spinal anesthesia. a report of 3 cases without morbidity*. *Anesthesiology* 70:866, 1989
- 9) Page MM, Watkins PJ: *Cardiorespiratory arrest and diabetic autonomic neuropathy*. *Lancet* 1:14, 1978
- 10) Craddock L, Pasvol G, Bull R, et al: *Cardiorespiratory arrest and autonomic neuropathy in AIDS*. *Lancet* 2, 2:16, 1987
- 11) Collins KJ: *Autonomic failure and the elderly. autonomic failure*. edited by Bannister R, New York, Oxford University. Press, 1988, p489
- 12) Mark AL: *The Bezold-Jarisch reflex revisited. clinical implications of inhibitory reflexes originating in the heart*. *JAM Coll Cardiology* 1:90, 1983
- 13) Thoren P: *Role of cardiac vagal c-fibers in cardiovascular control*. *Rev Physiol Biochem Pharmacol* 86:1, 1979
- 14) Hilgenberg JC, Johantgen WC: *Bradycardia after intravenous fentanyl during subarachnoid anesthesia (letter)*. *Anesth Analg* 59:162, 1980
- 15) Fortuna A: *Droperidol and spinal anesthesia (letter)*. *Anesth Analg* 63:782, 1984
- 16) Oberg B, Thoren P: *Increased activity in Lt ventricular receptors during hemorrhage or occlusion of caval veins in the cat. a possible cause of vasovagal reaction*. *Acta Physiol Scand* 85:164, 1972
- 17) Rocco AG, Vandam LD: *Changes in circulation consequent to manipulation during abdominal surgery*. *JAMA* 164:14, 1957
- 18) Schwarz, Shires, Spencer: *Principles of surgery*. 5th ed, New York, McGraw-Hill 1988, p1233
- 19) Bonica JJ, Berges PU, Morikawa K: *Circulatory effects of peridural block 1. effects of levels of*

- analgesia & dose of lidocaine. Anesthesiology* 33:619
1970
- 20) Bonica JJ, Kennedy WF, Akamatsu JJ, et al: *Circulatory effects of peridural block III. effects of acute blood loss. Anesthesiology* 36:219, 1972
- 21) 정소영, 정춘근: 경막외 마취중 고관절 전치환술시
발생한 심한 돌발성 서맥과 저혈압. 대한마취과학회
지 22:783, 1989
- 22) Brown DL, Carpender RL, Moore DC, et al: *Cardiac arrest during spinal anesthesia III. Anesthesiology* 68:971, 1988
-