기관내 삽관후 발생한 육아조직에 의한 성문하 협착 발생 1예

전북대학교 의과대학 마취과학교실

김동순 · 최현규 · 이준례 · 송희선

= Abstract =

A Case of Airway Obstruction due to Subglottic Necrotic Tissue Following Endotracheal Intubation

Dong Soon Kim, M.D., Hyeon Gyu Choe, M.D., Jun Rae Lee, M.D. and Hee Sun Song, M.D.

*Department of Anesthesiology, Chonbuk National University,
Medical School, Chonju, Chonbuk, Korea*

Acute airway obstruction is a serious emergency in children. This is a case report of airway obstruction due to subglottic necrotic tissue following endotracheal intubation. This 7-year old male patient was performed an endotracheal intubation for airway keep after car accident. The endotracheal tube remained in place for approximately 6 hours. After extubation, he was suffered from dyspnea and this symptom was exacerbated gradually. 3 days later, necrotic granulation tissue on subglottic area was removed by surgical intervention. After this procedure his problem and symptom was improved. It was considered that the formation of necrotic granulation tissue on subglottic area was a complication of endotracheal intubation. Histopathologic finding showed acute and chronic inflammatory cell infiltration and degeneration with necrotic change.

Key Words: Endotracheal intubation, Complication, Granulation tissue, Airway obstruction

소아에 있어서 기도폐쇄는 매우 위급한 응급 상황이다. 기도유지는 개체의 생명에 필수 불가결한 산소의 공급과 이산화탄소의 배출이라는 중요한 일을 담당하고 있는 것으로 여러가지 원인으로 인하여 기도폐쇄가 발생하였을 경우 이를 적극적으로 해결해 주어야만 한다. 1792년 Curry¹⁾씨에 의해서 최초로 인간에게 촉지법(tactile method)으로 기관내 삽관이 시도된 이래 그후 많은 학자들에 의해 연구 개발되었으며 1920년 Magill에 의해 조직손상이 적은 고무제품의 기관내관을 사용하기 시작하여 오늘날과 같은 기관내 삽관법이 정착되게 되었다.

이때부터 기관내 삽관은 전신마취의 중요한 방편으로서 뿐만 아니라 급성 기도폐쇄 환자의 소생술과 호흡부전 환자의 치료 목적으로 널리 애용되어 왔다. 기관내 삽관으로 많은 잇점을 얻을 수 있으나 여러가지 합병증도 따를 수 있으므로 기관내 삽관을 시행할 때 언제나 세심한 주의를 기울여야 한다.

저자들은 7세의 남자 환자가 교통사고에 의한 무의식 상태에서 응급처치 과정에서 기관내 삽관하에서 치료를 받고 발관후 3일째 이물질에 의한 기도폐쇄 양상의 심한 호흡곤란을 호소하여 이비인후과에서 기도협착과 급성 후두염 진단하에 수술적 방법으로 성문하 부위의

기도 내벽에서 약 4 cm 길이의 괴사성 육아조직을 제거하여 호흡곤란을 해소 할 수 있었으며 이를 응급처치 과정시 기관내 삽관에 의한 합병증으로 사료되어 문헌적 고찰과 함께 보고하는 바이다.

증 례

환자는 7세된 26 kg의 남아로 91. 7. 16일밤 교통사고로 발생한 뇌와 복부 좌상으로 ○○병원 응급실에서 응급처치와 함께 기관내 삽관으로 치료를 받고 발관후 연고지 관제로 본 병원으로 이송 되었다. 본 병원 응급실에서 호흡곤란이 심하였기 때문에 기도 협착과 급성 인후두염 진단하에 이비인후과에 입원하여 보존요법을 받다가 내원 3일후인 4월 19일 밤부터 호흡곤란이 악화되어 다음날 아침 수술적 치료를 위해 수술실로 이송 되었다.

환자는 과거력상 특이소견이 없었으며 수술전 혈압은 sBP/dBP: 125/75 mmHg 맥박은 분당 149회 정도로 빈맥을 보였으며 심한 빈호흡, 호흡곤란과 suprasternal retraction을 보였다. 흉부 청진상 wheezing sound가 전흉벽에서 청진되었으며 우측 폐하부에서는 호흡음이 감소되어 있었다.

수술전 혈액 검사상 WBC가 $12,000/\text{mm}^3$ 으로 증가되어 있었고 뇨 검사상 protein 1+, 이외에는 정상 이었고 간기능 검사상 SGOT 59 IU로 증가되어 있었고 혈당은 116 mg%으로 정상범위를 보였다. 흉부 X-선 검사상 우측 폐하부에서 상당히 호전된 상태의 대

엽성 폐렴 소견을 보였으며 경부 측면 사진상(Fig. 1) 성문하 부위의 기관내벽 상부가 4.5 mm 정도로 좁아져 있었고 그 이하부위의 기관 내경은 약 7~8 mm로 정상범위를 보였다.

Nasal catheter로 분당 5 L의 산소를 공급하면서 측정된 동맥혈 가스분석상 pH 7.32, PaCO_2 65.9 mmHg, PaO_2 84.9 mmHg, HCO_3 34.2 mmol/L, SaO_2 는 95%를 보여 심한 탄산가스 축적을 보여주고 있었다. 마취중 환자 감시장치는 심전도, 자동혈압 측정기, pulse oxymeter, capnometer등을 부착하였다. 마취유도 할때엔 환자가 더욱 호흡곤란을 심히 호소하고 pulse oxymeter상 산소포화도 즉 SpO_2 가 88%를 보여 마스크로 산소를 공급하면서 계속 SpO_2 를 관찰하고 92%일때 ketamine 30 mg을 정주한후 보조호흡을 시행하였다. SpO_2 가 98%까지 증가한 상태에서 자발호흡을 유지하면서 4% lidocaine분무에 의한 기관내 삽관을 고려하였으나 이는 더 이상의 후두 및 기관내벽의 손상을 야기할 우려가 있으며 마스크로 환기가 잘 되고 있었고 두경부 이학적 소견상 기관내 삽관이 어려움이 없어 보였으며 경부 측면 사진상 기관 협착 부위의 내경이 인지되어 있는 상태이므로 근이완제 투여에 의한 삽관이 더 용이할 것으로 판단하고 vecuronium 3 mg을 정주한후 내경 4.0 mm의 cuff 없는 polyethylene tube로 별 저항없이 1회에 기관내 삽관을 시행하였다.

환자는 기도저항을 고려하여 1회 환기량 200 ml에 분당 호흡수 25회를 실시하였으며 이때 SpO_2 는 98~

Fig. 1. Marked narrowing trachea(▲) in sabglottic area(neck lateral view).

Fig. 2. Emergency Explotracheotomy(arrow indicates the mass).

100%, 호기말 이산화탄소 분압은 36~40 mmHg로 유지되었다. 마취유지는 enflurane 1.5 volume%, O₂ 3 L, medical air 3L로 시행하였다.

삽관후 SpO₂는 98~100%를 보였고 E_TCO₂도 36~40 mmHg로 정상범위로 유지되었다. 2번째, 3번째 tracheal ring 부위를 절개하여(Fig. 2) 기도내벽내의 육아 조직을(Fig. 3) 제거한후 예정되었던 기도절

개는 환자의 예후와 합병증을 고려하여 시행하지 않았고 air leakage가 심하여 튜브를 cuff 없는 내경 5.5 mm로 바꾸어 수술이 끝날 때까지 호흡을 유지시켰다. Reversal agent는 glycopyrrolate 0.2 mg, pyridostigmine 8 mg을 사용하였고 자발호흡이 좋고 cooperation이 잘 된다고 판단되어 발관을 시행하고 pulse oxymeter로 감시하여 회복실로 이송하였다. 1시간 동안 심혈 관계 및 호흡 상태가 정상이어서 일반 병실로 이송한후 1주일 만에 건강한 상태로 퇴원하였다.

수술로 제거한 육아조직의 병리조직학적인 소견은 괴사성 변화를 나타내는 급성과 만성염증성 세포의 침윤을 보여 주었다(Fig. 4, 5).

고 안

기관내 삽관은 전신 마취를 하기 위해서나 무의식 환자 혹은 응급환자의 기도 확보를 위하여 널리 사용되어 왔다. 또한 기관내 삽관에 의한 합병증^{2,3)}도 많이 보고 되었으며 이 합병증의 조기 발견 및 예방이 중요

Fig. 3. Removed endotracheal mass(0.7×4.0 cm).

Fig. 4. Microphoto to graphic shows acute and chronic inflammatory cell infiltration and degenerafion with necrotic change(20×).

Fig. 5. High magnification of fig. 4(100×).

하다.

삽관 직후의 합병증으로는 조직의 손상등을 입을 수 있고 대부분의 경우에는 후유증이 없이 치료된다. 지연성 후유증으로는 성대마비, 후두부종 또는 기관지염 등이 올 수 있고 후두 부종중 가장 좋지 않은 것은 성문하 부종으로 대개 3세 이하의 소아에서 발관후 1~2시간 내에 발생한다. 치료는 가습된 산소호흡(large particle aerosol), racemic epinephrine의 분무로 점막의 부종을 감소시켜 준다. 이상의 방법으로도 효과가 없을 경우에는 전에 사용하였던 삽관 튜브보다 한단계 작은 크기의 기관내 삽관 튜브를 삽입해 주고 스테로이드나 이뇨제는 즉각적인 도움을 주지는 않으나 재 삽관된 환자에서 부종이 악화되는 것을 방지하기 위해 사용할 수 있다³⁾.

본 증례는 7세된 남아로 성문하 부종이 호발하는 연령보다 나이가 많았으며 대증요법으로 치료하였으나 흡기시 호흡곤란이 기도내 이물질 양상으로 더욱 악화되었다. 경부 X-선 사진상(Fig. 1) 성문하 부위가 많이 좁아져 있어 수술적 치료가 필요할 것으로 사료되어 2번째 3번째 tracheal ring 부위를 절개하여(Fig. 2) 기도 내에서 4 cm 길이의 이물질(Fig. 3) 즉

염증성 육아 조직을 제거해 낼 수 있었으며 수술적 제거후 증상의 호전을 가져 올 수 있었다. 이는 기관 튜브가 기도점막에 기계적 손상을 가져오고 여기에 염증성 궤양이 생기고 여기에 반응성 육아 조직이 초과 형성된 것으로 사료된다^{4,5)}.

제거한 조직의 병리조직학적인 검사상 급성, 만성 염증성 세포의 침윤을 볼 수 있었다(Fig. 4, 5).

소아에 있어서 급성 기도폐쇄는 매우 심각한 응급 상황이다. 감염과 이물질의 흡입이 소아에서 이러한 기도폐쇄의 주종을 이루며 이러한 경우는 문진과 이학적 검사에 의해 진단을 할 수가 있다. 이물질 제거를 위해서 혹은 기도폐쇄를 소통시키기 위해서 기관내 삽관과 전신마취가 필요하게 되나 경우에 따라서는 근육이완제의 사용으로 기도 폐쇄를 더욱 악화 시킬 수 있으므로 주의해야 한다^{6,7)}. 본 증례의 경우에도 마취유도시 근육이완제를 사용하지 않고 자발호흡을 유지하는 기관내 삽관을 고려하였으나 경부 X-선 사진상 기관협착 부위의 내경을 인지 할 수 있었고 마스크로 호흡을 잘 유지 할 수 있었으므로 기도 내벽의 손상을 방지하기 위하여 응급 기도 절개를 할 수 있는 준비를 한후 근육이완제를 투여하여 기관내 삽관을 어려움이

없이 할 수 있었다.

발관후에 오는 지연성 합병증으로 후두 육아종에 대한 보고는^{6,8,9)} 많이 있고, 또한 기관내 삽관 튜브의 폐색으로 기도 유지가 되지 않아 어려웠던 경우의 보고는 있으나 본 증례와 같이 삽관후 3일에 기도 내벽에서 육아종성 조직이 기도폐쇄를 가져온 사례는 찾아볼 수 없었다.

후두 육아종의 원인으로는 삽관 및 발관시의 직접적인 손상, 튜브에 의한 압박, 삽관기간의 과도한 연장, 개인적인 해부학적 소질 및 전신 상태등이 복합적으로 작용하여 발생한다고 볼 수 있다. 이외의 원인으로는 기도의 감염이 문제가 되며 Donnelly¹⁰⁾는 12시간 이상 삽관 마취한 대부분의 예에서 세균을 분리하였으며 후두 점막 손상에 따른 2차적 세균 감염이 있음을 지적하였다. Wattles¹¹⁾도 기도의 감염을 지적하면서 상기도 감염이 있는 환자에게 삽관마취는 금기라고 하였다. Donnelly¹⁰⁾ Elsamra⁴⁾등도 튜브 표면에서 연쇄상 구균을 분리하여 2차적인 세균감염이 존재함을 지적하였다. 일단 점막이 손상되고 그곳에 감염이 되면 점막의 치유가 지연되고 육아종이 생기는 것으로 생각된다. 본 증례의 성문하 육아 조직도 일련의 이러한 발생기전에 의한 것이 아닌가 사료된다. 또한 튜브 cuff 압력이 기도점막의 괴사와 직접적인 관련이 있을 것으로 사료되며 Nordin¹²⁾에 의하면 기도내벽에 대한 압력이 미세혈관 관류압(약 4kPa, or 30 mmHg)이하로 유지 된다면 기관내 점막의 손상 없이 튜브를 오랫동안 유지할 수 있다고 하였다.

Grillo¹³⁾은 high pressure low volume cuff가 기도 점막 손상을 가져온 경우를 보고 하였다.

후두 육아종이 크고 여러개가 발생한 경우에는 소아에서 기도폐쇄를 일으켰다는 보고도 있다³⁾. 성대 육아종의 발생의 예방을 위해서는 삽관시 후두의 손상이 없도록 하고 가능한 한 구경이 작은 튜브를 사용하고 충분한 근육이완제를 사용하여 두경부나 후두의 불필요한 운동을 줄이고 과도한 두경부의 신전이나 굴절을 피하고 청결하고 소독된 마취용구를 사용하는 것이 필요하다 하겠다.

요 약

7세의 남자 환자가 발관후 심한 호흡곤란과 과이산

화탄소 혈증을 보였다. 호흡곤란 양상이 이물질 폐쇄 증상을 보이고 대증 요법으로 호전되지 않아 전신 마취하에서 성문하 부위를 절개하여 육아종성 조직을 제거하여 치료할 수 있었으며, 이 육아종성 조직이 기관내 삽관에 의한 합병증으로 사료되어 보고하는 바이다.

참 고 문 헌

- 1) Collins VT. *Principle of Anesthesiology* 2nd ed. Lee & Febriger. Philadelphia. 1976; 319.
- 2) Dripps RD, Eckenhoff JE, Vandam LD. *Introduction to anesthesia* 8th ed. WB Saunders. Philadelphia. 1992; 153.
- 3) JF Nunn, JE utting, Burnell R, Brown JR. *General anesthesia* 5th ed. Butterworth. 1989; 534.
- 4) Elasma YE. *Laryngeal intubation granuloma. J Laryngo Otol* 1971; 85-939.
- 5) Epstein SS, Winston P. *Intubation granuloma. J Laryngol Otol* 1957; 71-37.
- 6) TM Akhtar, S Ridley, CJ Best. *Unusual presentation of acute upper airway obstruction caused by an anterior mediastinal mass. British Journal of Anesth* 1991; 67-632.
- 7) Jaff BF. *Postoperative hoarseness. Am J Surg* 1972; 123-432.
- 8) Balestrieri F, Watson CB. *Intubation granuloma. Otolaryngol Clin N Am* 1982; 12-567.
- 9) Myerson MC. *Granulomatous Polyp of the larynx following intratracheal anesthesia. AMA Arch Otolaryng* 1955; 62-182.
- 10) Donnelly WH. *Histopathology of endotracheal intubation: An autopsy study 99 cases. Arch* 1969; 88-511.
- 11) Watlles M. *Bilateral granuloma of the larynx following intratracheal anesthesia. Ann Otol Rhinol Laryngol* 1949; 58-873.
- 12) Nordin U. *The trachea and cuff induced tracheal injury: An experimental study on causative factor and prevention. Acta Otolaryng* 1976; 345-1.
- 13) Grillo HC, Cooper JD, Geffin B, Pontoppidan H. *A low pressure cuff for tracheostomy tubes to minimize tracheal injury. J Thorac Cardiovasc Surg* 1971; 62-898.