내경정맥 천자시 발생한 긴장성 기흉 —증례보고—

시립보라매병원 마취과*

서울의대 마취과학교실**

도 상 환 * · 손 종 찬 * *

=Abstract=

Tension Pneumothorax during Internal Jugular Catheterization —case report—

Sang-Hwan Do, M.D. and Jong-Chan Sohn, M.D.

Department of Anesthesiology, Boramae City Hospital, Seoul, Korea

Department of Anesthesiology, Seoul National University Medical College, Seoul, Korea

A case is presented of tension pneumothorax during internal jugular catheterization. Pneumothorax is one of complications of internal jugular catheterization but is very rare. If it occurs after anesthetic induction, discontinuance of N_2O is very important in order not to increase the size of pneumothorax. And if general safety measures are observed such as use of fine locator needle, confinement of needle depth and cannulation in end-expiratory phase, the occurrence rate of pneumothorax during the procedure could be much lessened.

Key Words : Internal jugular vein, Catheterization, Complication, Tension pneumothorax

중심정맥카테타는 혈관작용성 약제등의 투여시 필요한 중심정맥로를 확보하거나 또는 마취도중이나 중환자관리시 심혈관계의 상태를 감시하기 위하여 중심정맥압을 측정할 목적으로 시술하게 된다. 중심정맥카테타 거치시 이용되는 정맥은 내경정맥, 외경정맥, 쇄골하정맥, 주전정맥(antecubital vein) 등을 들 수 있는데 이 중에서 내경정맥과 쇄골하정맥이 가장 많이 이용되고 있다. 쇄골하정맥은 중심정맥카테타 시술시 기흉을 가장 많이 초래하며, 동맥천자시 압박에 의한 효과적인 지혈이 어려운 단점이 있다. 이에 반해서 내경정맥은 천자부위의 해부학적 위치선정이 용이하며, 우측을 이용할 경우

상대정맥과 거의 일직선을 이루고 있어서 카테타의 침단부가 상대정맥에 위치할 가능성이 가장 높고, 기흉을 초래하는 경우는 매우 드른 것으로 알려져 있어 중심정맥카테타 거치시 가장 추천되고 있다^{1,2)}. 내경정맥을 이용한 중심정맥카테타 거치시 발생한 긴장성 기흉은 국내에서는 아직 보고된 적이 없으나 이번에 저자들이 경험하였기에 문헌고찰과 함께 보고하는 바이다.

증 례

29세의 남자환자(175cm, 56kg)가 반복성 기흉의

진단하에 흉강경을 이용한 좌측폐의 폐부분절제술을 받게 되었다. 술전검사는 모두 정상 범위였으며 CT 판독결과 좌측폐의 기흉외에 양측 폐첨부의 다수의 소기포, 우측 폐첨부의 섬유성회화 결핵소견 등이 관찰되었다.

전신마취 유도후 우측 내경정맥을 이용하여 중심정맥 카테타를 거치하고자 하였다. 환자를 앙와위로 한 후 양쪽 견갑골 밑에 방포를 접어서 받쳤으며 머리는 왼쪽편으로 돌리고 20도 Trendelenburg 위치를 취하였다. 천자부위는 흉쇄유돌근의 흉두와 쇄두 및 쇄골이 이루는 삼각형의 꼭지점으로 하였다. 천자부위를 소독한 후 중심정맥카테타 세트(Leader-cath™, Vygon, France)에 들어 있는 16게이지 바늘에 10cc 주사기를 부착한 후 천자를 시작하였다. 수술시 마취기의 인공호흡기는 계속 작동되는 상태였다. 천자위치에서 우측 유두를 향하여 약 3.5cm 전진시 주사기끝에 혈액이 비쳤으나 혈액의 유출이 원활치 않아 조금씩 전진과 후퇴를 거듭하다가 약 4.5cm 전진시 공기가 흡인되었다. 즉시 바늘을 빼고 천자부위를 가아제로 압박하면서 환자상태를 관찰하였다. 약 2-3분 후 청진시 우측폐의 호흡음이 약하게 들리며 말초동맥혈 산소포화도가 점차로 65%까지 떨어져 기흉을 의심하고 흉부외과의사와 상의 후 곧바로 우측에 28Fr 흉관을 삽입하였다. 흉관삽입후 다량의 공기가 흉병으로 유입되면서 약 1-2분에 걸쳐서 말초동맥혈 산소포화도는 점차로 98%까지 회복되었다. 환자상태가 안정된 후 다시 우측 쇄골하정맥으로 중심정맥카테타를 거치하려고 시도하였는데, 처음에는 공기가 흡인되었으며 두번째 시도에서 성공하였다. 수술은 예정대로 좌측폐첨부의 설상절제술을 시행하였다.

6일후 다시 흉강경을 이용한 우측 폐첨부의 부분절제술을 시행하였다. 이번에도 또다시 우측 내경정맥에서 중심정맥 카테타를 거치하려고 시도하였다. 지난 번과 마찬가지로 환자의 체위를 잡았으며 천자부위는 지난 번에 비해 1cm 윗 쪽, 1cm 바깥 쪽으로 하였다. 21게이지 바늘이 부착된 10cc 주사기로 먼저 내경정맥의 위치를 확인하였는데, 약 2.7cm 깊이에서 혈액이 흡인되었으며 16 게이지 바

늘로 천자시 3.2cm 깊이에서 혈액이 흡인되어 유도용 도자를 바늘을 통해 삽입한 후 바늘을 제거하고 나서 유도용 도자를 따라 중심정맥 카테타를 거치하는데 성공하였다. 수술시 별 문제는 없었으며 환자는 그후 8일만에 퇴원하였다.

고 안

내경정맥을 이용한 중심정맥 카테타거치시 발생할 수 있는 합병증으로는 경동맥 천자, 혈종, 카테타의 이상위치 등을 들 수 있으며 기흉은 매우 드른 것으로 알려져 있다. Tyden³⁾의 보고에 의하면 500례의 환자에서 경동맥 천자가 16례 발생한 반면 기흉은 없었다고 하였으며, Fisher등²⁾은 262명의 환자에서 수술시 1례의 기흉이 있었다고 보고하였다. 기흉은 발생빈도는 드물지만 조기에 발견해서 치료하지 않을 경우 치명적일 수도 있다. 특히 본 증례와 같이 마취유도후에 수술하다가 기흉이 발생하는 경우에는 환자의 주관적 호소가 없어 객관적 징후만으로 기흉을 의심해야 하므로 진단에 어려움이 있을 수 있으며, 또한 양압호흡중에 기흉이 발생할 경우 빠른 속도로 긴장성 기흉으로 진행할 수 있으므로 주의를 요한다. 일단 기흉이 발생되면 N₂O는 기흉의 크기를 증가시키므로 즉시 투여를 중단해야 한다. Eger등⁴⁾의 연구에 의하면 개에서 300ml의 기흉이 75%의 N₂O 흡입시 10분이내에 두배의 크기로 되었다고 보고하였다. 본 증례에서는 기흉의 발생에서 흉관삽입까지 5분이내에 빨리 이루어져 별 문제는 없었으나 기흉이 의심되자마자 N₂O의 투여를 중단하는 것이 올바른 처치였을 것이다.

일반적으로 성인에서 내경정맥천자시 피부에서 약 1.5-3.0cm 깊이에서 내경정맥에 도달하는 것으로 알려져 있는데³⁾, 이에 비추어 보면 본 증례에서 4.5cm 까지 바늘을 전진시킨 것이 기흉을 초래하게 된 직접적인 원인이었던 것으로 생각된다. 또한 본 증례에서는 수술시 처음부터 16게이지의 굵은 바늘을 사용하였으나 이것은 일반적인 안전수칙에 어긋나는 것이다. 내경정맥천자시 가장 흔한 합병증인 경동맥천자의 위험성을 줄이기 위해서 먼저 가는

바늘(21 또는 22게이지)로서 내경정맥의 위치를 확인해 두는 방법이 추천되고 있다.⁵⁾

본 증례에서 술전 CT 검사상 발견된 우측 폐첨부의 다수의 소기포가 내경정맥천자시 기흉발생의 위험성을 어느정도 높였는지는 알 수 없으나, 시술시 쇄골하정맥천자시와 마찬가지로 인공호흡기의 작동을 멈추고 호기말인 상태에서 시술을 했었더라면 기흉발생예방에 도움이 되지 않았을까 생각된다.

내경정맥카테타거치시 환자의 체위를 Trendelenburg위로 하는 것이 반드시 필요한 조작은 아니며 환자가 순환혈액량의 감소를 보일 때에만 필요

한 것으로 알려져 있다⁶⁾. 율혈심부전 환자에서는 오히려 역Trendelenburg위를 취하는 것이 바람직하다. 아직 정확히 연구된 바는 없지만 본 증례에서도 Trendelenburg위를 취함으로써 폐첨부의 상방이동으로 내경정맥천자시 기흉발생에 일조를 하지 않았을까 생각된다. 결론적으로 내경정맥을 이용한 중심정맥카테타거치시 기흉발생은 매우 드문 합병증이지만 미리 가는 바늘로써 내경정맥의 위치를 확인해두고, 천자시 깊이를 제한하며, 호기말에 시술을 하는 등 일반적인 안전수칙을 지킨다면 기흉의 발생빈도를 더욱 줄일 수 있을 것으로 생각된다.

Fig. 1. Postoperative chest AP view of the patient with 2 chest tubes in each side.

참 고 문 헌

1. Cucchiara RF, Miller ED, Reves JG, Roizen MF, Savarese JJ. Anesthesia. 3rd ed, New York: Churchill Livingstone. 1990: 1043.
 2. Fisher J, Lundstroem J, Ottander HG. Central venous cannulation: a radiological determination of catheter positions and immediate intra-thoracic complications. Acta Anaesth Scand 1977; 21: 45-9.
 3. Tyden H. Cannulation of the internal jugular vein. Acta Anaesth Scand 1982; 26: 485-8.
 4. Eger EI, Saidman LJ. Hazards of nitrous oxide anesthesia in bowel obstruction and pneumothorax. Anesthesiology 1965; 26(1): 61-6.
 5. Belani KG, Buckley JJ, Gordon JR, Castaneda W. Percutaneous cervical central venous line placement: a comparison of the internal and external jugular vein routes. Anesth Analg 1980; 59: 40-4.
 6. Cucchiara RF, Miller ED, Reves JG, Roizen MF, Savarese JJ. Anesthesia. 3rd ed, New York: Churchill Livingstone. 1990: 1044.
-