백서 신경병증통증 모델에서 유도된 ERK 1/2와 CREB 신호 단백질에 대한 Ketamine의 억제효과

가톨릭대학교 의과대학 마취통증의학교실, *성빈센트병원 임상의학연구소

최진우 · 인장혁 · 김용신 · 강유진 · 임용걸 · 조수민 · 신은영* · 주진덕

Low dose ketamine reduces the induction of ERK1/2 and CREB signaling protein in a neuropathic pain model of rats

Jin Woo Choi, Jang Hyeok In, Yong Shin Kim, Yoo Jin Kang, Yong Gul Lim, Su Min Cho, Eun Young Shin*, and Jin Deok Joo

Department of Anesthesiology and Pain Medicine, *The Research Institute of Medical Science, Saint Vincent's Hospital, The Catholic University of Korea, Seoul, Korea

Background: In addition to causing the loss of voluntary sensory and motor function, spinal cord injury (SCI) often creates a state of central neuropathic pain. Rats given SCI display increases in the activated form of transcription factors ERK 1/2 MAPK and CREB in the spinal cord, which correspond to allodynia in a model of neuropathic pain. This study was conducted to determine if low dose ketamine had an effect on the activation of ERK 1/2 and CREB in the development of neuropathic pain.

Methods: This study was conducted to evaluate ERK 1/2 and CREB protein in a sham operated (control) group, neuropathic pain and normal saline (NP + NS) group and neuropathic pain and ketamine (NP + Keta) group. To accomplish this, male Sprague-Dawley rats were anesthetized and then subjected to L5-L6 spinal nerve ligation (SNL, neuropathic rats). The total amounts of ERK 1/2 and CREB protein were then assessed by western blot analysis. In addition, changes in the amounts of ERK 1/2 and CREB mRNA were evaluated by RT-PCR.

Results: There was a significant increase in the amount of ERK 1/2 and CREB in the NP + NS group when compared with the sham group. However, the amount of ERK 1/2 and CREB protein induced due to SNL were significantly reduced by continuous infusion with ketamine in the NP + Keta group.

Conclusions: The results of this study revealed a positive linkage between NMDA receptors and the ERK-CREB signaling pathway. Therefore, NMDA receptors could be the target of future therapeutic approaches. Additionally, the results of the present study provide additional evidence that low dose ketamine effectively prevents and treats central neuropathic pain following SNL. (Korean J Anesthesiol 2009; 57: 210~6)

Key Words: CREB, ERK 1/2, Ketamine, Neuropathic pain.

서론

Received: January 12, 2009.

Revised: 1st, January 31, 2009; 2nd, February 15, 2009.

Accepted: May 5, 2009.

Corresponding author: Jin Deok Joo, M.D., Department of Anesthesiology and Pain Medicine, The Catholic University of Korea, Ji-dong, Paldal-gu, Suwon 442-723, Korea. Tel: 82-31-249-7212, Fax: 82-31-258-4212, E-mail: joojd@catholic.ac.kr

Copyright © Korean Society of Anesthesiologists, 2009

© This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

일상적 사고에 의해서 말초신경에 손상을 받을 경우 손상된 부위의 자율신경계, 감각 및 운동신경계의 이상이 수반되고 기능장애를 동반하는 신경병증통증(neuropathic pain)이 유발될 수 있고[1], 실제 임상에서 많이 경험할 수 있는 만성 척추질환, 암성통증, 대상포진 후 신경통, 삼차신경통(trigeminal neuralgia), 복합부위 통증증후군(complex regional pain syndrome, CRPS) 등 신경병증통증은 우리 주위에 많이 존재하고 있다. 신경병증통증의 대표적 증상은 통각과민(hyperalgesia)과 이질통(allodynia)을 특징으로 하며 만성통증

의 특성상 건강상태를 악화시키고 일상 생활의 활동성을 제한함으로써 삶의 질을 현저하게 악화시키지만 현재까지 이를 치료할 수 있는 수술 방법이나 약제가 없는 실정으로 교감신경차단, 진통제, 항우울제, 항경련제 등을 사용하고 있지만 만족할 만한 치료 성과는 보지 못하고 있다[2]. 신경병증통증의 발생에 관한 연구에 의하면 척수신경 손상 후 척수 부위에서 증가하는 세포 외 흥분성 아미노산(extracellular excitatory amino acid, EEA)은 통증과 관련된 여러 수용체를 활성화 시키고 세포 내 칼슘 농도를 증가시킨다[3]. 그 중에서도 glutamate 수용체의 활성화는 중추신경 감각화(central sensitization)로 알려진 통증 전달 경로에서 척수신경의 과흥분상태를 만든다[4]. 이와 같은 척수신경의 흥분 전달 과정에서 N-methyl-D-aspartate (NMDA) 수용체의 활성화는 세포 내에서 adenylyl cyclase, protein kinase A (PKA), protein kinase C (PKC), calmodulin kinase (CaMK) 등의 단백질을 활성화 시킨다[5]. 세포 내 신호전달 과정(intra-cellular cell-signaling pathway)에서 신경손상에 의한 연속단계(cascade)의 수용체 자극은 extracellular signal-regulated kinase 1/2 (ERK 1/2) 와 c-Jun NH₂-terminal kinase (JNK), p38 등을 포함하는 많은 양의 mitogen-activated protein kinases (MAPKs) 와 cyclic AMP response element binding (CREB)의 증가를 일으키며 신경병증통증의 형성 과정에 중요한 역할을 하는 것으로 보고되고 있다[6-8]. 따라서 우리는 NMDA 수용체의 길항제인 소량의 ketamine 사용이 세포 내 신호전달 단백질인 ERK 1/2, CREB의 생성을 줄여주고 신경병증통증으로의 만성화 과정을 억제하리라는 생각에서 본 연구가 고안되었다.

대상 및 방법

본 연구는 본 대학의 실험동물 윤리위원회에서 승인을 받은 후 규정에 따라 진행되었다. 실험 당시 180–200 g의 수컷 흰쥐(Sprague-Dawley)를 사용하였으며 신경병증통증 모델 쥐의 제작 및 행동검사는 Kim 및 Chung의 방법을[9] 이용하였다. 수술은 실험동물을 피하조직 내로 pentobarbital sodium (50 mg/kg or to effect)의 주입으로 마취시킨 후 요추부위의 정중선을 따라 3번째 요추에서 2번째 천추까지 피부절개를 한 후 좌측 주위 근육을 절혀 6번째 요추의 횡돌기를 제거하고 제 5, 6 요수신경을 노출시켰다. 이 신경들을 5-0 silk로 묶어 신경 손상을 준 다음 근육과 피부를 봉합하였다. 손상 후 1–2주 사이에 기계적 자극으로서 von Frey filament (24 mN)를 수술한 쥐의 뒷발바닥에 2–3초 간격으로 10번 자극했을 때 몇 번이나 발을 피하였는가를 측정함으로써 발의 회피 반응 빈도(frequency of withdrawal response)를 조사하였다. 10회의 자극 중 5회 이상의 회피 반

응을 보인 쥐를 성공적인 신경병증통증 모델군으로 실험을 실시하였다[10]. 수술과정은 같으나 신경을 묶지 않은 sham 수술 쥐를 대조군으로 사용하였다. 신경병증통증에 대한 ketamine효과를 알아보기 위하여 등쪽의 피하조직 내로 mini-osmotic pumps (model 2ML1, Durect, USA)를 이용해서 소량의 ketamine을 10 μ l/h (40 mg/kg/day)의[11] 속도로 주입한 신경병증통증 ketamine군(NP + Keta군, n = 7)과 생리식염수를 주입한 신경병증통증 생리식염수군(NP + NS군, n = 7)을 대조군(n = 7)과 비교 관찰하였다.

조직의 분리와 Western blot 분석

1주 후 산소와 5% sevoflurane으로 쥐를 깊게 마취한 후 머리를 절단하여 뇌를 적출하였으며 거의 동시에 미추 부위를 절단하고 생리식염수를 척추관으로 강하게 주입하여 척수를 경추 쪽으로 밀어내어 적출하였다. 적출된 뇌와 척수 조직은 액화질소를 이용 급속 냉동한 후 초저온 냉장고(–80°C)에 보관 사용하였다. 급속 냉동 보관된 쥐의 뇌와 척수조직을 얼음 위에서 녹인 후 분쇄하여 즉시 차가운 RIPA (radioimmunoprecipitation assay) 완충액(150 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, and 1% Triton-X100 [pH 7.4])에 넣고 10초 정도 균질화 용해시켰다. 조직을 1시간 동안 초 원심분리(32,500 rpm, 4°C, vacuum) 시킨 후 시험관 상층부의 액체를 수집하였다[12]. Bradford method로 각 단백질 양을 분석한 후에 Laemmli 완충액으로 단백질을 안정화시켰다. 각각의 단백질 샘플(50 μ g)을 10% SDS (sodium dodecyl sulfate)-polyacrylamide gels를 통해 80 V에서 4시간 동안 전기영동 시켜 얻어진 단백질 대(band)를 20 V, 4°C에서 Transfer unit을 이용하여 밤 동안 PVDF (polyvinylidene fluoride) 막으로 단백질을 운반시켰다. TBST (Tris-Buffered Saline Tween-20) 용액(0.1% Tween 20 in 1 × TBS) 과 blocking 용액(5% dry milk in TBST)으로 PVDF 막을 잘 씻고 blocking 용액을 도포한 후 phospho-ERK와 total-ERK, phospho-CREB와 total-CREB의 1차 항체(Cell Signaling Technology, USA)를 사용하였으며, PVDF 막을 TBST 용액으로 잘 씻어내고 2차 항체(goat anti-rabbit or anti-mouse IgG)를 1시간 동안 배양시킨 후 ESL (electronic system level) 용액(Amersham, USA)과 UVP (ultraviolet products) Bio-imaging System (Upland, USA)을 이용하여 현상하였다.

ERK 1/2와 CREB의 mRNA분석을 위한 반정량적 역전사 중합효소 연쇄반응(Reverse transcriptase-polymerase chain reaction, RT-PCR)

쥐의 뇌와 척수조직에 Trizol reagent (MRC, USA) 1 ml을 첨가하고 균질화한 후 5분간 실온에서 반응시켰다. 0.2 ml의 1-bromo-3-chloropropane (Sigma, USA)을 첨가한 후

14,000 rpm에서 15분간 원심분리하였다. 상층액을 분리하여 동량의 Phenol : Chloroform = 5 : 1 (pH 4.7) (Sigma, USA)을 첨가하여 혼합한 후 14,000 rpm에서 10분간 원심분리하였다. 상층액을 분리하여 100% ethanol를 가한 후 -20°C 에서 한 시간 반응시킨 후 14,000 rpm에서 10분간 원심분리하였다. 상층액을 버리고 RNA 침전물을 75% ethanol로 씻은 후 DEPC (diethylenepycarbonate) water를 가하고 60°C 에서 5분간 반응시킨 후 냉장고(-70°C)에 보관하였다. 추출한 RNA의 양과 순도는 260 nm와 280 nm에서 흡광도를 측정하여 결정하였다. 추출된 총 RNA 0.5 μg 을 원형(template)으로 하여 AMV (avian myeloblastosis virus) Reverse Transcriptase (Promega, USA)을 이용하여 cDNA 50 μl 를 합성하였다. 합성된 cDNA 2 μl 를 이용하여 dNTPs (each at 2.5 mM/L), 1 unit I Start Taq DNA polymerase (Intron, Korea), 각각의 시발체(primer) 20 $\mu\text{M/L}$ 이 포함된 최종 반응액을 10 μl 로 만들어 중합효소 연쇄반응을 시행하였다(Table 1). 중합효소 연쇄반응은 95°C 에서 30초의 변성(denaturation), 55°C 에서 30초의 결합(annealing), 72°C 에서 1분의 증폭(extension) 과정으로 총 35주기(cycle)를 진행하였고, 이후 72°C 에서 10분간 반응시켜 마무리하였다. 세포에서 적절한 mRNA가 분리되었는지 알아보기 위하여 내부 대조 유전자로 228 bp크기의 β -actin을 사용하였다. 증폭된 PCR 산물은 2.0% agarose gel에서 전기영동을 시행한 뒤 ethidium bromide 염색한 후 Gel DocTM XR (Bio Rad, USA)를 이용하여 분석하였다.

모든 값은 mean $\pm$ SEM으로 표시하였으며 통계적 처리는 SPSS 12.0를 사용하였다. 세 군 사이의 처리 의미 비교는 one-way ANOVA와 Tukey's post hoc를 사용하였고 두 군 간에는 Student's t-test로 비교하였다. P값이 0.05 보다 작은 경우에 통계적으로 유의하다고 판정하였다.

결 과

먼저 뇌신경조직을 가지고 시행한 ERK 1/2와 CREB 단백

질의 Western blot 분석과 RT-PCR 후의 mRNA의 발현비교 결과에서 대조군과 NP + NS군, NP + Keta군 간에 있어서 서로의 차이를 발견할 수 없었다. 그러나 척수신경 조직을 통한 ERK 1/2 단백질의 양적 변화는 NP + NS군에서 136.0 ± 12.5 로 대조군 94.9 ± 9.0 과 비교할 때 43% 증가를 보였다($P = 0.02$) (Fig. 1). NP + Keta 군에서는 70.0 ± 11.5 로 NP + NS군과 비교 시 26%의 의미 있는 감소를 나타낸 반면($P = 0.0021$), 대조군과의 비교에서는 의미 없는 약간의

Fig. 1. The expression of ERK 1/2 and CREB was measured by immunoblotting. (A) Representative immunoblots images for extracellular signal-regulated kinase 1/2 (ERK 1/2) and cyclic AMP response element-binding (CREB) protein from spinal cord subjected to sham operation (n = 7), NP + NS group (n = 7) and NP + Keta group (n = 7). NP: neuropathic pain, NS: normal saline, Keta: ketamine. (B) Densitometric quantifications of band intensities. ^aP < 0.05 versus Sham group, ^bP < 0.05 versus NP + NS group.

Table 1. RT-PCR Primer Sequences

Primer	Accession no.	Sequence (5' → 3')	Size (bp)	Cycle no.	Annealing temp. (°C)
β -actin	NM 031144	F : AGCCATGTACGTAGCCATCC R : CTCTCAGCTGTGGTGGTGAA	228	35	55
ERK 1	S 46779	F : ATGAAGGCCCGAAACTACCT R : ATCCAGCTCCATGTCAAAGG	237	35	55
ERK 2	M 64300	F : AATAAGGTGCCGTGGAACAG R : ACGGCTCAAAGGAGTCAAGA	395	35	55
CREB	X 14788	F : GGCCTGCAGACATTAACCAT R : CCTCTCTCTTCGTGCTGCT	256	35	55

RT-PCR: reverse transcriptase-polymerase chain reaction, ERK 1/2: extracellular signal-regulated kinase 1/2, CREB: cyclic AMP response element-binding.

Fig. 2. The expression of mRNAs encoding ERK 1/2 and CREB was measured by RT-PCR. (A) Representative RT-PCR images for extra-cellular signal-regulated kinase 1/2 (ERK 1/2) and cyclic AMP response element-binding (CREB) protein from spinal cord subjected to sham operation (n = 7), NP + NS group (n = 7) and NP + Keta group (n = 7). Representative of 3–5 separate experiments. β -actin included to control for mRNA input. NP: neuropathic pain, NS: normal saline, Keta: ketamine. (B) Densitometric quantifications of band intensities. ^{a)}P < 0.05 versus Sham group, ^{b)}P < 0.05 versus NP + NS group.

감소를 보였다(P = 0.1172) (Fig. 1). CREB 단백질의 변화는 대조군 49.9 ± 9.6 과 비교해 볼 때 NP + NS군에서 124.5 ± 15.9 로 약 2.5배의 의미 있는 증가를 보였고(P = 0.0017) (Fig. 1), NP + Keta군에서는 71.4 ± 11.3 로 NP + NS군과 비교할 때 43%의 의미 있는 감소를 보였다(P = 0.0187) (Fig. 1). 그리고 역시 NP + Keta군의 대조군과의 비교에서는 ERK 1/2에서처럼 별 차이가 없었다(P = 0.1716) (Fig. 1). 한편 RT-PCR를 통한 ERK 1/2 mRNA와 CREB mRNA의 세 군간 양적 비교에서는 Western blots과 마찬가지로 신경병증 통증으로 유도되었던 ERK 1/2 mRNA와 CREB mRNA가 소량의 ketamine 사용으로 발현이 감소되는 결과를 관찰할 수 있었다(Fig. 2).

고 찰

신경병증통증의 발생에는 말초신경계와 중추신경계에서 여러 독립적인 병태생리학적 기전이 다양한 양상으로 표현된 신경병증 증상을 만드는데 관여한다. 내분비성 만성질환, 암성통증, 만성 척추질환, 대상포진 바이러스질환 등으

로 인한 대부분의 신경병증통증은 말초신경의 손상 등 일차적인 병변뿐만 아니라 신경계통의 기능변화에 의해 기인되며 자발통, 이질통, 통각과민을 주 증상으로 한다[13]. 일반적으로 알려진 신경병증통증의 기전은 중추신경 감각화로 척수 후각의 조직학적 또는 생리학적 변화로 구심성 통증신경전달 과정 중 신호의 지속적인 과 흥분상태에 의해 수용체의 밀도와 역치, 활동성 등의 변화가 일어나 통증 전달이 비정상적으로 증가하는 현상이다. 이 과정의 핵심적인 수용체가 glutamate 수용체로 이 수용체의 인산화로 신경연접부에서 수용체 수가 증가하고, 흥분성 신경전달 물질인 glutamate에 대한 반응성이 증가하게 된다. 이처럼 흥분성의 증가는 역치 아래의 자극에도 반응을 일으키며, 역치 이상의 자극에는 더 증가된 반응을 야기시킨다[14].

통증의 전달에 관여하는 흥분성 단백질 수용체인 glutamate 수용체에 대한 연구, 그 중에서도 특히 칼슘 통로와 연관된 깊은 NMDA 수용체의 활성증가가 통증전달체계에 직접적인 영향을 미치는 것으로 보고되고 있다[15-17]. 이처럼 수용체에 대한 관심은 여러 수용체들의 세포막에서의 활성화와 그에 따른 세포 내 무수히 많은 단백질의 변화가 결국

은 통증 전달 경로에 있어 중요한 역할을 할 것으로 생각되어 최근에는 세포 신호 전달체계(cell signaling pathway)에 대한 연구가 분자 생물화학적 기초 분야의 눈부신 발달과 더불어 많이 연구되고 있다. G protein-coupled 수용체(GPCRs)의 일종인 glutamate 수용체는 신경막에 위치하는 막 관통(transmembrane) 수용체로 이온성(ionotropic)과 대사성(metabotropic)이 있다. Ionotropic 수용체(ligand-gated ion channel)로는 AMPA, NMDA, kainate 수용체가 있고 metabotropic 수용체는 8개의 아형이 있다. Ionotropic 수용체가 활성화되면 Na^+ , K^+ , Cl^- 같은 이온의 출입을 허용하는 통로(channel)를 열고, 반면에 metabotropic 수용체가 활성화되면 세포 내에서 일련의 사건들이 촉발되어 결과적으로 이온 통로가 열리지만 반드시 이차신경전달물질(cAMP, cGMP, IP3, DAG 등)이 연관된다[18]. 따라서 GPCRs와 관련되어 있는 많은 수용체가 이온 통로의 작용에 관여하게 되는데, 세포 내 신호전달 단백질인 PKC와 glutamate transporter(EAAT3), phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K), MAPKs, CREB 등의 활동에 영향을 미치기도 한다[19-21]. Labombarda 등에 [22] 의하면 척수신경 손상 후 증가가 확인된 PKC와 NMDA 수용체의 mRNA로 볼 때 중추 신경병증통증을 만들고 지속시키는데 NMDA 수용체의 양적 증가와 활성화가 중요한 역할을 한다고 하였다. Garry 등은[23] 쥐의 척수신경 허혈 손상(spinal constriction injury) 후 척수조직에서 증가한 p38과 p42/44 (ERK 1/2) MAPK가 만성 신경병증통증을 만드는데 중요하며 과정 중에 아교세포에서 나오는 cytokine과 VPAC2 (vasoactive intestinal peptide receptor), NK2 (neurokinin), NMDA 수용체가 관여한다고 하였다. Song 등은[7] 쥐의 척수신경 허혈 손상 시 ERK 경로의 활성화가 만성 신경병증통증을 만드는데 기여하며 pERK의 기능은 부분적으로 CREB단백질에 의존한 유전자 발현을 통해서 이루어진다고 하였다. 또한, Ma와 Quirion은[8] 쥐의 좌골신경 손상 후 3주째에 척수후각에서 PKC γ 와 CREB의 확인한 증가를 확인하였으며 이것의 의미는 CREB의 인산화가 신경병증통증을 유발하고 지속시키는데 관여하는 것 이라고 하였다. CREB는 43 kDa의 핵 전사요소로 serine 133 부위에서 인산화를 통하여 활성화되며 척수신경의 과 흥분상태에서 증가하고 활성화되는 ERK 1/2, p38 MAPK와 더불어 만성통증의 형성 과정에 중요한 역할을 한다고 보고되고 있다[24]. 이처럼 대부분의 신경병증통증의 기전에 관한 연구들이 GPCRs를 통한 세포 내 신호전달 과정에서 ERK 1/2와 p38 등을 포함하는 많은 양의 MAPKs와 CREB 단백질 발현의 밀접한 관계를 언급하고 있다.

본 연구에서는 쥐의 신경병증통증 모델에서 NMDA 수용체, Ca^{2+} -permeable ionotropic 수용체와 G-protein coupled 수용체, β 6-integrin 수용체, cytokine 수용체 등의 여러 요소에

의해서 영향을 받게 되는 세포 내 신호전달 단백질 중에 ERK 1/2 MAPK와 CREB를 Western blots과 RT-PCR과정을 통해 변화한 총 단백질의 양과 유전자적 측면에서 각 신호 단백질의 mRNA를 증폭 정량 분석함으로써 신경병증통증의 발생 기전을 보다 명확히 하고 치료제로서 NMDA 수용체의 길항제인 ketamine의 사용 가능성을 알아보고자 금번 실험이 시행되었다.

Ketamine은 50여 년 동안 진통작용 및 고 용량에서 해리성 정맥마취제로 임상에서 사용되어 온 NMDA 수용체 길항제로 phencyclidine 접합 부위에 결합하여 활성화된 이온 통로를 차단하는 외에도 이온통로가 활성화되지 않은 세포막과 연관된 부위에 결합하여 작용을 한다고 알려진 흥분성 아미노산과 비 경쟁적 길항제로 말초의 유해한 구심성 자극을 약화시키고 척수 후각에서 wind-up 현상을 차단하며 통각과민을 억제하는 역할을 기대하여 신경병증통증 환자에게 치료 목적으로 구강이나 정맥투여로 가끔씩 이용되어 왔다[25].

Ketamine의 NMDA 수용체에 대한 길항작용은 쥐에 대한 투여와 쥐의 척수에의 투여로 실험해본 결과 침해성 자극에 대한 반응의 감소와 더불어 조직 손상과 연관된 척수 후각의 신경원(neuron)의 활성 증가를 감소시키는 효과를 보였고[26], 이는 다양한 신경병증통증의 증상들, 즉 이질통과 통각과민, 자발통의 치료에 효과를 보이게 한다[27]. 그 외에 ketamine은 통증조절과 관계되는 다른 여러 가지의 작용들이 보고 되고 있는데, Durrani 등은[28] ketamine이 국소마취제와 유사한 작용을 가지고 있는 것과 관련이 있는 것으로 여겨지는 정맥을 통한 부위마취의 성공을 보고하였으며, Schnoebel 등은[29] ketamine이 농도 의존적이고 가역적으로 사람의 신경세포에서 Na^+ 통로의 전도를 억제하고 이온 통로의 전압 의존성 활성화와 비활성을 변화시킨다고 보고하였다. 또한, Hevers 등은[30] ketamine이 phencyclidine과 달리 alpha6-delta subunit을 포함하는 GABA(A) 수용체를 선택적으로 강화시킨다고 하였다. 본 실험에서도 연속 주입된 소량의 ketamine은 신경손상에 의해 척수신경에서 증가된 흥분성 아미노산의 양을 줄여주고 신경병증통증의 장기간 강화 과정에서 NMDA 수용체의 활성억제로 GPCRs의 세포 내 신호전달과 연관된 ERK 1/2 MAPKs와 CREB 신호단백질의 양을 각각 26%와 43%씩 감소시켰다.

결론적으로 금번 실험의 결과를 살펴볼 때 쥐의 척수신경 결찰로 유발된 신경병증통증 모델에서 세포 내 신호전달 단백질인 ERK 1/2와 CREB 단백질의 의미있는 증가를 관찰할 수 있었다. 이는 역으로 ERK 1/2와 CREB 단백질을 포함하는 세포 내 여러 반응들이 신경병증통증을 만드는데 관여한다고 볼 수 있다. 또한 신경병증통증 상태에서 치료제로 사용된 소량의 ketamine은 증가된 ERK 1/2와 CREB 단

백질을 의미 있게 감소시켜 주었다. 따라서 NMDA 수용체 길항제인 ketamine의 GPCRs를 통한 만성통증으로의 진행과정 억제와 국소마취제와 유사한 통증 전달 과정의 차단효과 등은 신경병증통증으로의 진행과정을 억제시켜 줌으로써 신경병증통증으로 발전 가능성이 예상되는 환자의 질환 형성 예방과 극심한 증상을 호소하는 환자의 치료 목적 모두를 위하여 유용한 약제로 사용될 수 있을것으로 생각된다.

ACKNOWLEDGEMENTS

The authors wish to acknowledge the financial support of the Catholic Medical Center Research Foundation made in the program year of 2009.

REFERENCES

1. Sato J, Perl ER. Adrenergic excitation of cutaneous pain receptors induced by peripheral nerve injury. *Science* 1991; 251: 1608-10.
2. Lee HJ, Shin SW, Jang HJ. The combined antiallodynic effect of gabapentin and milnacipran in a rat neuropathic pain model. *Korean J Pain* 2007; 20: 8-14.
3. Faden AI, Simon RP. A potential role for excitotoxins in the pathophysiology of spinal cord injury. *Ann Neurol* 1988; 23: 623-6.
4. Christensen MD, Hulsebosch CE. Chronic central pain after spinal cord injury. *J Neurotrauma* 1997; 14: 517-37.
5. Willis WD. Long-term potentiation in spinothalamic neurons. *Brain Res Brain Res Rev* 2002; 40: 202-14.
6. Xu JT, Xin WJ, Wei XH, Wu CY, Ge YX, Liu YL, et al. p38 activation in uninjured primary afferent neurons and in spinal microglia contributes to the development of neuropathic pain induced by selective motor fiber injury. *Exp Neurol* 2007; 204: 355-65.
7. Song XS, Cao JL, Xu YB, He JH, Zhang LC, Zeng YM. Activation of ERK/CREB pathway in spinal cord contributes to chronic constrictive injury-induced neuropathic pain in rats. *Acta Pharmacol Sin* 2005; 26: 789-98.
8. Ma W, Quirion R. Increased phosphorylation of cyclic AMP response element-binding protein (CREB) in the superficial dorsal horn neurons following partial sciatic nerve ligation. *Pain* 2001; 93: 295-301.
9. Kim SH, Chung JM. An experimental model for peripheral neuropathy produced by segmental spinal nerve ligation in the rat. *Pain* 1992; 50: 355-63.
10. Shim B, Gwak YS, Yoon DM, Leem JW, Nam TS, Paik KS. Sensitization of cutaneous nociceptors in neuropathic rats. *Korean J Pain* 2002; 15: 32-42.
11. Houghton AK, Parsons CG, Headley PM. Mrz 2/579, a fast kinetic NMDA channel blocker, reduces the development of morphine tolerance in awake rats. *Pain* 2001; 91: 201-7.
12. Lee HT, Emala CW. Adenosine attenuates oxidant injury in human proximal tubular cells via A (1) and A (2a) adenosine receptors. *Am J Physiol Renal Physiol* 2002; 282: F 844-52.
13. Baron R. Mechanisms of disease: neuropathic pain--a clinical perspective. *Nat Clin Pract Neurol* 2006; 2: 95-106.
14. Woolf CJ. American College of Physicians, American Physiological Society: Pain: moving from symptom control toward mechanism-specific pharmacologic management. *Ann Intern Med* 2004; 140: 441-51.
15. Gao X, Kim HK, Chung JM, Chung K. Enhancement of NMDA receptor phosphorylation of the spinal dorsal horn and nucleus gracilis neurons in neuropathic rats. *Pain* 2005; 116: 62-72.
16. Visser E, Schug SA. The role of ketamine in pain management. *Biomed Pharmacother* 2006; 60: 341-8.
17. Ultenius C, Linderöth B, Meyerson BA, Wallin J. Spinal NMDA receptor phosphorylation correlates with the presence of neuropathic signs following peripheral nerve injury in the rat. *Neurosci Lett* 2006; 399: 85-90.
18. Nakanishi S, Masu M, Bessho Y, Nakajima Y, Hayashi Y, Shigemoto R. Molecular diversity of glutamate receptors and their physiological functions. *EXS* 1994; 71: 71-80.
19. Yoshii A, Constantine-Paton M. BDNF induces transport of PSD-95 to dendrites through PI3K-AKT signaling after NMDA receptor activation. *Nat Neurosci* 2007; 10: 702-11.
20. Mao L, Wang JQ. Interactions between ionotropic and metabotropic glutamate receptors regulate cAMP response element-binding protein phosphorylation in cultured striatal neurons. *Neuroscience* 2002; 115: 395-402.
21. Vanhoutte P, Barnier JV, Guibert B, Pagés C, Besson MJ, Hipskind RA. Glutamate induces phosphorylation of Elk-1 and CREB, along with c-fos activation, via an extracellular signal-regulated kinase-dependent pathway in brain slices. *Mol Cell Biol* 1999; 19: 136-46.
22. Labombarda F, Coronel MF, Villar MJ, Nicola AF, González SL. Neuropathic pain and temporal expression of preprodynorphin, protein kinase C and N-methyl-D-aspartate receptor subunits after spinal cord injury. *Neurosci Lett* 2008; 447: 115-9.
23. Garry EM, Delaney A, Blackburn-Munro G, Dickinson T, Moss A, Nakalembe I, et al. Activation of p38 and p42/44 MAP kinase in neuropathic pain: involvement of VPAC2 and NK2 receptors and mediation by spinal glia. *Mol Cell Neurosci* 2005; 30: 523-37.
24. Crown ED, Ye Z, Johnson KM, Xu GY, McAdoo DJ, Hulsebosch CE. Increases in the activated forms of ERK 1/2, p38 MAPK, and CREB are correlated with the expression of at-level mechanical allodynia following spinal cord injury. *Exp Neurol* 2006; 199: 397-407.
25. Warncke T, Stubhaug A, Jorum E. Ketamine, an NMDA receptor antagonist, suppresses spatial and temporal properties of burn-induced secondary hyperalgesia in man: a double-blind, crossover comparison with morphine and placebo. *Pain* 1997; 72: 99-106.
26. Haley JE, Sullivan AF, Dickenson AH. Evidence for spinal N-methyl-D-aspartate receptor involvement in prolonged chemical nociception in the rat. *Brain Res* 1990; 518: 218-26.
27. Eide K, Stubhaug A, Oye I, Breivik H. Continuous subcutaneous

- administration of the N-methyl-D-aspartic acid (NMDA) receptor antagonist ketamine in the treatment of post-herpetic neuralgia. *Pain* 1995; 61: 221-8.
28. Durrani Z, Winnie AP, Elemer KZ, Burnet ML. Ketamine for intravenous regional anesthesia. *Anesth Analg* 1989; 68: 328-33.
29. Schnoebel R, Wolff M, Peters SC, Bräu ME, Scholz A, Hempelmann G, et al. Ketamine impairs excitability in superficial dorsal horn neurones by blocking sodium and voltage-gated potassium currents. *Br J Pharmacol* 2005; 146: 826-33.
30. Hevers W, Hadley SH, Lüddens H, Amin J. Ketamine, but not phencyclidine, selectively modulates cerebellar GABA (A) receptors containing $\alpha 6$ and delta subunits. *J Neurosci* 2008; 28: 5383-93.
-