股關節全置術의 麻酔

全南大學校 醫科大學 麻酔科學教室

<指導 河 仁 鎬 教授>

河 正 聲

=Abstract=

Anesthesia for Total Hip Prosthesis

Jung Sung Ha, M.D.

Department of Anesthesiology, Chonnam University Medical School

(Directed by Prof. In Ho Ha, M.D.)

It has been generally known that hypotension may occur during total hip prosthesis with general anesthesia. However, The cause of hypotension is not well known.

In these cases, of total hip prosthesis during general anesthesia, the following results were obtained.

- 1) during total hip prosthesis, blood pressure fell,
- 2) intravenous injection of effortil and dexamethasone improved the hypotension.

緒 論

股關節全置術에 있어서 人工髌臼 或은 人工骨頭에 骨을 固定하기 爲해서 acrylic cement가 使用되고 있다.

本劑는 粉末과 液體로서 이워지며 常溫下에서 即時重合을 일으키는 acryl樹脂이다. 液體成分은 methyl-methacrylate monomer, 2% dimethylparatoluidine, 0.01% hydroquinone이며 이들 中의 藥物이 血壓下降이나 心臟停止를 일으킨다고 한다.

全南醫大 附屬病院 手術室에서 大腿骨 骨髓腔에 上記한 cement의 注入時에 血壓下降의 發生을 경험하였 으며 이의 豫防을 위해서 cement의 注入直前 2~3分에 昇壓劑인 effortil이나 dexamethasone의 靜脈內 注入으로 血壓下降의 發生을 防止하였음을 經驗하였기 에 문헌적 고찰과 함께 報告하는 바이다.

症 例 I.

患者는 47歲의 가정주부로서 入院 約 8個月 前부터

左側 股關節 部位에 間歇적으로 痛症을 느꼈으며 이러한 症狀이 入院 5個月 前부터는 점차 惡化되어 步行에 支障을 초래하기 시작했으며 入院 당시의 全身狀態는 左側 股關節部位에 壓痛과 腫脹이 있고 약간의 運動장애가 있는 것 이외는 별 특징적 소견은 보이지 않았다.

X-선 검사소견은 흉부 X-선에서 右上葉에 calcified tbc.를 볼 수 있었고 左側 大腿骨 X-線에서는 subcapital fracture와 함께 左側大腿骨頭에 無菌性괴사의 양상을 보였다.

手術前 小便檢査와 肝機能檢査는 정상 범위내 이었 으며 血液소견은 RBC가 393萬, Hb 이 11 gm, Hct. 가 36%, bleeding time 이 3分, clotting time 이 5分 이었고 心電圖上에서 sinus tachycardia 이외에는 특 기할만한 소견은 없었다. 手術室 도착후 血壓은 140/80 mmHg, 脈搏은 105/分이었고, 전처치로써 phenobarbital 100 mg 을 수술전날 저녁에 근육주사하고 또한 steroid의 使用病歷이 있어서 prednisolone 20 mg 을 전날 저녁에 투여하고 수술당일 아침에 20 mg 을 근육 주사 하였다.

症 例 1

麻醉導入은 2.5% thiopental sodium 350 mg 과 succinylcholine chloride 50 mg 의 靜注 後 氣管内 挿管하고 halothane-N₂O-O₂를 使用하여 麻醉을 維持하였다. 麻醉導入 約 15分후 手術을 시작하여 30分후에 髌臼에 cement 를 注入하니 血壓이 120/80 mmHg 에서 90/70 mmHg 까지 下降하였다. 이때 脈搏은 120/分에서 130/分으로 增加하였다. 즉시 halothane 의 흡입을 中止하고 N₂O-O₂만으로 麻醉를 유지하면서 dexamethasone 10 mg 과 solucortef 100 mg 을 靜注하니 血壓은 100/80 mmHg 으로 유지되었다. 이후 5分이 지나도 더 이상의 血壓上昇이 없어 solucortef 100 mg 을 靜注하고 다시 effortil 2 mg 을 靜注하니 血壓은 110/80 mmHg, 脈搏은 120/分으로 유지되었다. 手術始作 約

80分後에 骨髓腔에 cement 를 注入하였으며 이때는 血壓下降이 나타나기 전에 effortil 10 mg 을 靜注하였더니 血壓은 115/80 mmHg 에서 100/75 mmHg 까지 약간의 下降을 나타냈고 이때 일시적인 부정맥을 보였으나 별다른 치료없이 곧 소실되었다. 이후에는 더 이상 血壓下降이 없었으며 점차 上昇하여 110/70 mmHg 로 유지되어 手術을 끝마쳤으며 수술 18일만에 퇴원하였다.

症 例 II.

患者는 57歲의 男子로서 入院 3年前부터 右側股關節 部位에 痛症이 있었으며 그후 몇달뒤 左側股關節 部位

症 例 2

에서도 痛症을 느꼈다. 그러나 이때는 步行 장애는 볼 수 없었으나 약 1년전부터 보행장애가 나타나기 시작했으며 入院 당시 全身狀態는 兩側股關節 部位에 疼痛 및 壓痛과 運動障礙가 있는 것 外에는 다른 이상은 없었다.

胸部 X-線에 old minimal tbc.가 있었으며 골반 X-線에서 左側 大腿骨頭 部位에 囊胞性 變化가 있었고 兩側 大腿骨에 無菌性壞死의 양상을 보였다. 手術前 小便 檢査나 肝기능검사는 정상범위내 이었으며 血液所見은 Hb 12.8 gm%, Hct 47%, RBC 486萬, bleeding time 이 2分, clotting time 이 10分으로서 거의 모두 정상범위내 이었으며 心電圖에서는 左心室肥大 外에는 다른 이상은 없었다. 手術室 도착시 血壓은 190/90 mm

Hg, 脈搏은 102/分이었으며 麻酔導入은 2.5% thiopental sodium 375 mg 과 succinylcholine chloride 50 mg 을 靜注하여 導入후 氣管内 插管하고 halothane-N₂O-O₂로 維持하였다. 이때 血壓은 160/90 mmHg, 脈搏數는 105/分이었다. 左側 髌臼에 cement 注入후 즉시 血壓이 下降하기 시작하여 130/70 mmHg 를 보이고 다시 100/60 mmHg 까지 떨어졌다. 이때 즉시 dexamethasone 8 mg 과 effortil 10 mg 을 靜注하였던바 血壓은 서서히 올라서 150/90 mmHg 를 維持하고 約 20分 후에 左側 大腿骨 骨髓腔에 cement 를 注入하니 다시 血壓下降이 일어나 120/80 mmHg 를 나타내고 脈搏數는 100/分이었다. 즉시 halothane 의 흡입을 중지시키고 N₂O-O₂만으로 麻酔를 유지하고 effortil 10 mg 을 靜注하니

血壓는 서서히 오르기 시작하여 10분후에는 160/95 mm Hg를 보였다. 이후 약 1시간 후에 右側 髌臼에 cement의 注入 前에 halothane의 흡입을 중지하고 N_2O-O_2 로서 마취를 유지하였으나血壓은 140/85 mmHg에서 105/75 mmHg로 下降하였으며 脈搏數는 100/分에서 115/分으로 증가하였고 이때에는 혈압상승제의 투여없이 약 5분후부터 서서히血壓은 上昇하여 140/80 mmHg 脈搏數는 105/分으로 유지되었다.

다시 30분후 右側 大腿骨 骨髓腔內에 cement를 注入한즉血壓은 100/65 mmHg까지 下降하여 effortil 10 mg을 靜注하였으나血壓下降이 오래 지속되었으며 약 30분후에 혈압이 오르기 시작하여 140/80 mmHg으로 유지되었다.

수술후 경과는 좋았으며 수술 37일만에 퇴원하였다.

考 按

1958년에 Charnley는 acrylic cement를 股關節全置術에 使用하였다. Cement에 依한 固定力은 固定하기 以前에 比하여 約 200倍라고 생각되고 있다¹⁾. 그러나 本手術中에血壓下降이나 心停止를 일으키는 原因으로써는 1) monomer의 순환계에의 吸收, 2) 骨髓腔內壓의 上昇에 依한 循環系에의 脂肪이나 骨髓成分의 유리에 依한 肺塞栓 3) monomer의 肺에 對한 영향, 4) cement의 重合 時의 發熱 등을 들고 있다. 1970년에 Powell등²⁾은 2例의 心停止를 보고하였으며 그中 1例는 心停止 後 100% 산소 흡입과 閉胸式 心맞사지로서 心臟 소생후 手術을 계속하여 術後 이상없이 퇴원하였다고 보고 하였다. Harris³⁾는 cement를 使用한 膝關節全置術時 止血帶를 풀고난 후 術中 死亡한 例를 보고 하였으며 死因은 脂肪塞栓症이라고 했다. Charnley⁴⁾는 本症 24例에서血壓下降이 一過性이었으며 稀有하게도 3分間 이상 지속하나 5分間 이상 지속한 例는 없었다고 보고하였다. Phillips등⁵⁾은 大腿骨骨髓腔內에 cement를 注入하면 90秒 이내에血壓下降이 일어나며 髌臼의 경우에는血壓변화가 적었다. 그 이유를 大腿骨과 髌臼의 表面과의 血管狀態의 差에 의한다고 하였다. 本症例에서도 骨髓腔內에 cement 注入후 12~90秒 後에 약 15 mmHg 정도의血壓下降을 보이고 수분간 지속하였으며 髌臼에 注入時는血壓下降도가 심하지 않아 約 5 mmHg 정도이었다. 髌臼에 注入時 血壓下降도가 심하지 않는 것은 骨髓腔內보다 血管의 分포가 적어서 monomer의 흡수면적이 적기 때문이라고 한다.

Thomas등⁶⁾은 術前血壓, cement를 注入한 部位(大

腿骨 或은 髌臼), monomer와 polymer와의 混合된 時間과 血壓변동과의 關係를 조사한 결과 術前의血壓이 높을수록 cement에 依한血壓下降이 크며 또한 大腿骨 骨髓腔에 cement의 注入시 下降이 현저하며 混合時間과의 關係는 명백치 않았다고 보고하였다. 本症例에서도 術前 血壓이 높은 患者에서는 그血壓下降도가 컸다. 또한 effortil을 使用함으로써血壓下降을 어느정도 억제시킬 수 있었던 것은 effortil의 藥理作用인 昇壓作用이 脈搏數에는 거의 變化를 일으키지 않고 心搏出量과 分時搏出量을 증가시키며 말초저항은 오히려 감소시킨다고 한다. 따라서 心搏出量이 증가하면 靜脈壓이 上昇하고 靜脈血流이 증가하는데 이는 장기조직에 저류되었던 血流을 축출하여 循環血流量의 증가를 招來한다고 한다. 따라서 monomer로 인하여 심근억제작용 또는 肺血管저하의 上昇으로血壓下降을 일으킨다고 사료할때이의 교정목적으로 effortil의 使用은 타당한듯 하다.

따라서 股關節全置術의 acrylic cement 使用時 血壓下降의 예방 및 환자 관리에 있어서는 특히 心肺血管系 질환이 있는 患者, 고령자, steroid 투여를 받은자, 高血壓인 患者등에 있어서 더욱 注意를 기하여야 할 것이라고 사료된다.

結 論

股關節全置術의 麻酔에 있어서 다음과 같은 血壓變動과 그에 對한 藥物效果를 보았다.

- 1) 股關節全置術의 麻酔中 cement 注入直 後 血壓下降을 보았다.
- 2) 발생한 血壓下降에 對해 effortil과 steroid(hydrocortisone, dexamethasone)의 靜注는 血壓의 矯正과 血壓下降防止의 效果를 보았다.

參 考 文 獻

- 1) 長井淳ほか: Charnley手術の特長と, その注意點について, 災害醫學, 15:705, 1972.
- 2) Powell J eN, et al.: Cardiac arrest associated with bone cement. Brit. Med. J. 3: 326, 1970.
- 3) Harris UN.: Cardiac arrest and bone cement. Brit. Med. J. 3:523, 1970.
- 4) Charnley J.: Acrylic cement in orthopedic surgery. Baltimore, Williams and Wilkins Co., 1970.
- 5) Phillips H, et al.: Cardiovascular effect of implanted acrylic bone cement. Brit. Med. J. 3: 460, 1971.
- 6) Thomas TA, et al.: Cold curing acrylic bone cement. Anesthesiology, 26:298, 1971.